

Cliënt met (sterk vermoeden van) Covid-19
beoordeeld door een arts

Geen verdenking bij cliënt op Covid-19
beoordeeld door een arts

Medewerker hoest/niest (maar zonder koorts)

Kamerisolatie cliënt + testen

Overige cliënten op dezelfde woongroep: quarantaine

Preventief chirurgisch mondneusmasker indien afgesproken

Laten testen via de teststraat van Amarant of via de GGD.

A Medewerkers dragen PBM bij betreden cliëntenkamer.

B Benodigde PBM**

- handschoenen (bij iedere cliënt wisselen)
- een schort met lange mouwen
- chirurgisch mondneusmasker bij meerdere cliënten tot 3 uur onafgebroken dragen. Niet tussentijds uitdoen, anders nieuw PBM.
- beschermbril of faceshield

C Heeft cliënt 24 uur geen klachten? Stop PBM in overleg met arts.

Medewerkers dragen PBM:

- handschoenen (bij iedere cliënt wisselen)
- chirurgisch mondneusmasker (bij meerdere cliënten tot 3 uur onafgebroken dragen. Niet tussentijds uitdoen.)

Is uitslag negatief? Contact met cliënten en collega's is verantwoord.

Is uitslag positief? Dan pas weer contact na minimaal 7 dagen na start symptomen + 48 uur koortsvrij + 24 uur klachtenvrij.

Sneltest negatief en in afwachting van PCR-test? Dan werken met PBM.

Extra PBM bestellen? Dat kan via [dit bestelformulier](#).

- Medewerker laat zich testen vanwege contact met een positief geteste collega (o.b.v. contactonderzoek manager): na negatieve test nog 10 dagen werken met PBM.
- Medewerker heeft buiten werk om contact gehad met een positief geteste persoon of huisgenoot (of persoon in afwachting van de uitslag van test): wanneer jij zelf geen klachten hebt, onmisbaar bent voor de (directe) clientenzorg en continuïteit van die zorg, en hierover afstemming heeft plaatsgevonden met je manager, mag je komen werken met PBM. Bij ontstaan van klachten, direct laten testen.

ALGEMEEN

- Draag geen hand-/armsieraden of kunstnagels.
- Pas na uittrekken handschoenen en mondneusmasker handhygiëne toe.
- Kleed je op het werk om en was je werkkleren dagelijks uit.

Instructievideo's (klik hieronder)

1. Juist gebruik van mondkapjes
2. Zo werken wij schoon: aan- en uittrekken van PBM

Isolatie:

Client waarbij een (sterk vermoeden tot) besmetting is vastgesteld, wordt op zijn kamer/in zijn appartement verzorgd. De cliënt blijft op zijn kamer/appartement en heeft geen contacten met medecliënten en zo min mogelijk contacten met medewerkers.

Quarantaine:

Cliënten met verhoogd risico door onbeschermd contact met patient waarbij een (sterk vermoeden tot) besmetting vastgesteld is, verblijven binnen de woonvoorziening. Doel: risico om anderen te besmetten te voorkomen.